

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

## de la Vendimia

**Tamaño:** Pequeño.

**Forma:** Ovada o cónico truncada. En algunos frutos marcadamente rebajada en la zona pistilar. Contorno irregular.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrecha o mediana, profunda o poco profunda, con bordes irregulares. Fondo con chapa grisácea o marrón. **Pedúnculo:** Corto, sobresaliendo un poco por encima de los bordes. Fino, rojizo, leñoso y levemente lanoso.

**Cavidad del ojo:** Amplia o mediana y poco profunda. Bordes levemente mamelonados, fondo limpio o ruginoso, a veces teñido de rojo. **Ojo:** Pequeño y mediano, herméticamente cerrado. Sépalos largos y medios, solapándose y puntas vueltas.

**Piel:** Levemente grasa. **Color:** Amarillo con chapa rojo vivo a ciclamen. Punteado pequeño, de color blanquinoso y vistoso sobre la chapa y casi invisible en la zona amarilla del fondo.

**Tubo del cáliz:** Cónico o con embudo corto. Estambres por la mitad.

**Corazón:** Pequeño, centrado, bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas, cartilaginosas.

**Semillas:** Alargadas y aplanadas de un lado.

**Carne:** Color crema o blanco crema, con frecuencia teñida de rojo bajo la epidermis en el lado de la chapa, con fibras amarillas. Crujiente, jugosa, levemente perfumada. **Sabor:** Agradable.

**Maduración:** Otoño, en Pontevedra.

